

Wichtige Information zur CORONA-IMPfung an alle Patienten

- Lesen Sie aufmerksam das Aufklärungsblatt zur Schutzimpfung (Achtung: je nach Impfstoff unterschiedliche Ausführungen). Das Formular in 2-facher Ausführung unterschreiben und mit zur Impfung bringen
- Das Anamnese-Formular und die Einwilligungserklärung in 2-facher Ausführung ausfüllen, unterschreiben und zur Impfung mitbringen
- Ihren Impfausweis -falls vorhanden- zur Impfung mitbringen
- Bitte die Person, die die Impfung durchführt, nochmals speziell darauf hinweisen, falls es in der Vergangenheit schon mal zu einer heftigen Impfreaktion gekommen ist
- Nach der Impfung wird eine Nachbeobachtungszeit von mindestens 15 Minuten empfohlen, bei schweren Vorerkrankungen oder Einnahme eines Gerinnungshemmers (z.B. Marcumar, Xarelto, Lixiana oder Eliquis) sogar 30 Minuten. Falls wir Ihnen nach der Impfung keinen Platz in der Praxis anbieten können, halten Sie sich bitte in unmittelbarer Nähe der Praxis auf, sodass sie bei Auftreten von Beschwerden sofort mit uns Kontakt aufnehmen können
- Falls Stunden nach der Impfung grippeähnliche Beschwerden wie Fieber, Schüttelfrost, Muskelschmerzen, Kopfschmerzen, Gelenkschmerzen oder Schmerzen an der Einstichstelle auftreten empfehlen wir die Einnahme von 2 Tabletten Paracetamol (je 500 mg), wobei die Einnahme nach jeweils 8 Stunden wiederholt werden kann
- Notieren Sie sich den Termin zur Zweitimpfung (BioNTech nach 6 Wochen, AstraZeneca nach 12 Wochen!)

Wichtige Information zur CORONA-IMPfung an alle Patienten

- Lesen Sie aufmerksam das Aufklärungsblatt zur Schutzimpfung (Achtung: je nach Impfstoff unterschiedliche Ausführungen). Das Formular in 2-facher Ausführung unterschreiben und mit zur Impfung bringen
- Das Anamnese-Formular und die Einwilligungserklärung in 2-facher Ausführung ausfüllen, unterschreiben und zur Impfung mitbringen
- Ihren Impfausweis -falls vorhanden- zur Impfung mitbringen
- Bitte die Person, die die Impfung durchführt, nochmals speziell darauf hinweisen, falls es in der Vergangenheit schon mal zu einer heftigen Impfreaktion gekommen ist
- Nach der Impfung wird eine Nachbeobachtungszeit von mindestens 15 Minuten empfohlen, bei schweren Vorerkrankungen oder Einnahme eines Gerinnungshemmers (z.B. Marcumar, Xarelto, Lixiana oder Eliquis) sogar 30 Minuten. Falls wir Ihnen nach der Impfung keinen Platz in der Praxis anbieten können, halten Sie sich bitte in unmittelbarer Nähe der Praxis auf, sodass sie bei Auftreten von Beschwerden sofort mit uns Kontakt aufnehmen können
- Falls Stunden nach der Impfung grippeähnliche Beschwerden wie Fieber, Schüttelfrost, Muskelschmerzen, Kopfschmerzen, Gelenkschmerzen oder Schmerzen an der Einstichstelle auftreten empfehlen wir die Einnahme von 2 Tabletten Paracetamol (je 500 mg), wobei die Einnahme nach jeweils 8 Stunden wiederholt werden kann
- Notieren Sie sich den Termin zur Zweitimpfung (BioNTech nach 6 Wochen, AstraZeneca nach 12 Wochen!)